

APÊNDICE D – PROCEDIMENTOS PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

1. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Trabalhadores do Serviço de Vigilância dos *campi* deverão fazer uso adequado de máscaras, durante todo o turno de trabalho, devendo trocá-las a cada duas horas.

Deverão manter distanciamento de dois metros entre os colegas de trabalho. E quando tiverem que efetuar abordagem de pessoas e veículos deverão respeitar o distanciamento seguro de 1,5m.

Em todo o período de trabalho deverão lavar frequentemente as mãos tendo a disposição álcool gel 70% para os períodos de ronda.

2. SERVIÇOS DE LIMPEZA

A Universidade, neste momento de pandemia, adota como estratégia de combate ao COVID-19, nas suas instalações, o uso de solução de peróxido de hidrogênio acelerado (OXIVIR) como produto desinfetante de nível intermediário.

As equipes de higienização, própria e terceirizada, são orientadas, continuamente, quanto a diluição, manipulação, recolhimento e uso de EPIs. Porém, aqueles setores que sentirem necessidade de orientações quanto ao uso, poderão solicitar ao Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, pelo e-mail covid19@furb.br.

2.1 Periodicidade de Limpeza Geral:

Os pisos das áreas comuns deverão ser higienizados a cada troca de turno com solução de OXIVIR, diluído a 1:64, mantendo a área sem circulação pelo mínimo de 10 minutos, conferindo eficácia a aplicação do produto. Importante observar que a limpeza e desinfecção de pisos deve obrigatoriamente utilizar a técnica de dois baldes para evitar a contaminação cruzada nos espaços. As áreas, quando necessárias, deverão ser identificadas com placas de piso escorregadio para evitar eventuais acidentes. Nas áreas de saúde a diluição do OXIVIR para aplicação no piso deverá ser de 1:16. Após a aplicação, o produto deverá secar naturalmente, não devendo passar panos secos ou outras soluções na tentativa de acelerar o processo de fixação.

Importante reforçar que o produto escolhido pela Universidade (OXIVIR) será utilizado para limpeza e eliminação de vírus a uma diluição de 1:64 conforme indicação do

fabricante (Johnson&Johnson), como medida de limpeza, na aplicação em superfícies e no chão. Nos ambientes de saúde e laboratórios a diluição adotada suprirá a limpeza e desinfecção, sendo modificada para 1:16, também conforme indicação do fabricante.

Este produto é livre de agentes corrosivos ou danosos as superfícies metálicas e plásticas.

Quanto as superfícies, nos ambientes de uso comum, tais como: maçanetas das portas, corrimões, botões de elevadores, interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, serem limpas com OXIVIR, a cada turno e sempre que a circulação for intensa no local.

As instalações sanitárias, excetuando-se as áreas de saúde, deverão ser limpas duas vezes a cada turno, mantendo disponível sabonete líquido, toalhas de papel e preparações alcólicas a 70% em formato gel e com recolhimento dos resíduos sem aproveitamento de recipientes (sacos de lixo).

Orienta-se continuamente a manutenção e reposição das preparações alcólicas antissépticas a 70% para higienização das mãos disponíveis nos ambientes da instituição principalmente em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas, saídas, corredores, elevadores, entre outros.

Orienta-se também na rotina diária de limpeza limitar o uso do aspirador de pó e varredura seca em áreas internas para não favorecer a origem de partículas sólidas;

Sempre que necessário, a equipe de limpeza abastecerá os frascos identificados de OXIVIR, sendo a equipe de cada um dos ambientes, responsável pelo seu uso.

2.2 Cuidados e Atribuições da Equipe de Limpeza:

As equipes de limpeza, inicialmente, deverão proceder com os seguintes cuidados:

- Apresentar-se com o uniforme completo e limpo;
- Utilizar calçados profissionais: fechados, impermeáveis e com sola antiderrapante;
- Frequentemente higienizar as mãos;
- Durante o período de trabalho não utilizar adornos como anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos;
- Manter os cabelos presos, unhas limpas, aparadas e sem esmalte. A mesma orientação serve aos profissionais do sexo masculino sendo que, neste caso, manter a barba feita;
- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de forma apropriada conforme orientações recebidas;

- Sempre utilizar a varredura úmida, podendo ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.
- Sempre que necessário a equipe de limpeza deverá repor os produtos de higiene, como sabonete e papel toalha;
- Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem ser preferencialmente encaminhados à lavanderia para processamento ou lavados manualmente no expurgo;
- Os discos das enceradeiras devem ser lavados e deixados em suporte para facilitar a secagem e evitar mau cheiro proporcionado pela umidade;
- Proceder a limpeza e higienização de todos os equipamentos a cada término da jornada de trabalho;
- Quando necessário, sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto se procede a limpeza do outro lado;
- Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas.
- Não esquecer ou depositar materiais e equipamentos de limpeza nos ambientes de uso coletivo e individual;
- Os baldes devem ser lavados e secos antes de nova utilização;
- A revisão da limpeza deve ser feita nos três períodos: manhã, tarde e noite;
- Recolher sacos de resíduos dos recipientes próprios quando 80% de sua capacidade preenchidos ou sempre que necessário, evitando excesso;
- Transportar os resíduos recolhidos em carros próprios, para não arrastá-los, mantendo a tampa fechada sem que haja coroamento, evitando que os sacos encostem no corpo.

2.3 Desinfecção em casos de ambientes com casos suspeitos e ou confirmados de COVID-19:

O processo será iniciado a partir da determinação do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, após a ocorrência de um caso suspeito ou confirmado.

Estes ambientes passarão por limpeza e desinfecção terminal com uso de água e sabão seguido de desinfecção com OXIVIR diluído a 1:16, conforme orientações previamente recebidas pela equipe de limpeza.

A desinfecção de pisos ou paredes será feita da seguinte forma:

- Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o auxílio do rodo ou mop. Enxaguar e secar;

- Aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria orgânica, deixando o tempo necessário para ação do produto (seguir orientação do fabricante). Se necessário, realizar enxágue e secagem.

No caso da desinfecção de mobiliários:

- Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente, na superfície a ser desinfetada, com o auxílio de panos de mobília;

- Após a limpeza, realizar a fricção com o OXIVIR;

Após a limpeza e desinfecção, o local deverá permanecer fechado e inabitável, por no mínimo 48 horas, devendo estar afixado, no ambiente, a restrição de uso com a data de liberação.

A equipe de limpeza encontra-se em constante aperfeiçoamento para emprego de técnicas de treinamento específico para higiene e desinfecção dos materiais, superfícies e ambientes, com revisões periódicas quanto as atualizações.